Molekulardynamische Simulation der Keimbildung in übersättigten Gasen

Martin Horsch

24. November 2006

Vortragsgliederung

- klassische Keimbildungstheorie
- Ansätze für die Simulation von Keimbildungsprozessen
- Simulationen mit realistischer Anfangskonfiguration
- Simulationen mit eingesetzten Clustern
- empirische Keimbildungsraten

klassische Keimbildungstheorie

Begründet durch Vollmer und Weber (1926).

$$\text{Übersättigung } \mathcal{S} = \frac{p}{p_{\text{sat}}}$$

$$\text{chem. Potentialdifferenz } \Delta\mu(\mathcal{S}, T) = k_{\mathcal{B}} T \ln \mathcal{S}$$

$$\text{Oberflächenenergie } \varphi(\nu) = a\sigma\nu^{\frac{2}{3}}$$

$$\text{Clusterbildungsenergie } E(\nu, \mathcal{S}, T) = a\sigma\nu^{\frac{2}{3}} - \nu k_{\mathcal{B}} T \ln \mathcal{S}$$

Das Maximum $E^*(\mathcal{S}, T)$ von E liegt bei der kritischen Clustergröße $\nu^*(\mathcal{S}, T)$.

$$\nu^* = \frac{8a^3\sigma^3}{27\Delta\mu^3} \quad \text{und} \quad E^* = \frac{4a^3\sigma^3}{27\Delta\mu^2}$$

Dabei ist $a = A(\nu) \cdot \nu^{-\frac{2}{3}}$ von ν unabhängig.

Keimbildungskinetik nach der klassischen Theorie

Clusterverteilung: je N_ν Cluster der Größe ν .

Wir betrachten nur Größenänderungen mit $\Delta\nu = \pm 1$.

Für auf den Erwartungswert bezogene Zeitableitungen $\dot{N}_\nu = \frac{dE(N_\nu)}{dt}$ gilt:

$$\text{Kondensation } \beta = \frac{N_1}{V} \cdot \sqrt{\frac{k_B T}{2\pi m_1}}$$

$$\text{Verdampfung } \gamma(\nu) = \text{Flächen- \& Anzahlkorrektur} \cdot \beta \text{ bei } S = 1$$

$$\text{Dabei ist } \beta > \gamma(\nu) \iff \nu > \nu^*.$$

$$\begin{aligned} \dot{N}_\nu = & \beta a(\nu - 1)^{\frac{2}{3}} \cdot N_{\nu-1} + \gamma a(\nu + 1)^{\frac{2}{3}} \cdot N_{\nu+1} \\ & - (\beta + \gamma) \cdot \gamma a \nu^{\frac{2}{3}} \cdot N_\nu \end{aligned}$$

Keimbildungsrate

Der metastabile Zustand erfüllt die Bedingung

$$\dot{N}_1 = 0 \text{ für } \nu < \nu^*, \quad \text{falls } N_1 = \dot{N}_1 = 0 \text{ für } \nu \geq \nu^*.$$

Betrachten wir den metastabilen Zustand ohne diese Randbedingung.

Definition:

$$\text{Keimbildungsrate } J(S, T) = \frac{1}{V} \cdot \sum_{\nu \geq \nu^*} \dot{N}_1$$

Nach der klassischen Keimbildungstheorie ist

$$\begin{aligned}
 J(S, T) &\sim \frac{N_1}{V} \cdot e^{-\frac{E^*(S, T)}{k_B T}} \\
 -\log J(S, T) + \log \left(\frac{N_1}{V} \right) &\sim \frac{E^*(S, T)}{k_B T} \sim \frac{1}{T^3 \cdot \log^2 S}.
 \end{aligned}$$

Clusterkriterien

geometrisches Kriterium nach Stillinger (1963):

$$r < \frac{3\sigma}{2}$$

energetisches Kriterium nach Hill (1955):

$$U_{\text{pot}}(\mathbf{r}) + U_{\text{kin}}(\mathbf{v}_{\text{rel}}) = 4\varepsilon \cdot \left(\left(\frac{\sigma}{r} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r} \right)^6 \right) + \frac{m\mathbf{v}_{\text{rel}}}{2} \leq 0$$

mit Schallgeschwindigkeit statt $\mathbf{v}_{\text{rel}}$: energetisch-geometrisches Kriterium

hybrides Clusterkriterium:

- Teilchen ist flüssig gdw. $U_{\text{pot}} + U_{\text{kin}} \leq 0$ erfüllt ist.
- flüssige Teilchen sind miteinander verbunden gdw. $r < \frac{3\sigma}{2}$ gilt.
- Cluster sind 2-Zusammenhangskomponenten im entstehenden Graphen.

Thermostatisierung in der MD-Simulation

Ansätze:

- gesamtes System – Gas wird kälter, Cluster wärmer als T
- nach Phasen getrennt – beschreibt das Phasengleichgewicht am besten
- nur Gasphase – realistisches ΔT – beschreibt Kinetik am besten
- Trägergas – realistisch – beeinflusst Nukleation

Algorithmen:

- zufällig: setzt U_{kin} für ausgewählte Teilchen auf den Zielwert
- isokinetisch: hält ΣU_{kin} durch Skalierung von v konstant
- Berendsen (1984): isokinetisch mit Zeitverzögerung
- Nosé-Hoover (1986): Einführung eines zusätzlichen formalen Freiheitsgrads

Vergleich aktueller Arbeiten

	N	t / Δt	Thermostat	Kriterium
Schaaf et al. (2001)	216	3 Mio.	zufällig, nur Gas	geom.
Toxværd (2004)	40000	10 Mio.	TG	?
Krasnochtchekov (2005)	50000	?	Berendsen, TG	geom.
Tanaka et al. (2005)	10000	180000	isokin., z.T. mit TG	energ.-geom.
Kraska (2006)	1000	?	n/a	?
Trudu et al. (2006)	6912	n/a	?	?
ITT: aktueller Stand	1 Mio.	250000	isokin., nur Gas	hybr.
Ziel des SFB 716 (2010)	10 Mrd.			

Raum · Zeit einer Simulation: $10^{-30} \text{ m}^3 \text{ s}$

mit Überschalldüsen messbare Keimbildungsraten: $10^{17} \frac{1}{\text{m}^3 \text{ s}}$

Wachstumsstatistiken

Einsetzen eines großen Clusters

- getrennte Äquilibrierung der Gasphase und der flüssigen Phase
- setze kugelförmigen Cluster in die Simulation der Gasphase ein

Effekt der großen Zahl geht verloren $\Rightarrow$ unsichere Ergebnisse

Generierung mittelgroßer und großer Cluster

Wachstums- und Zerfallsraten

96³ CO₂-Moleküle, 2.45 mol/l (anfangs 6.0 mol/l), 253 K

Methode

Äquilibrierung bei sehr hoher Übersättigung
 Teilchen aus Gas / kleinen Clustern entfernen

Effekt

«Zeitraffer» vor Simulationsbeginn
 mehr und größere Cluster, weniger Gasteilchen

Beobachtung

stärkeres Clusterwachstum
 Erklärung von β nur durch N_1 ist ungenügend

Übergangswahrscheinlichkeiten

Anzahl mittelgroßer Cluster

96³ CO₂-Moleküle, 3.05 mol/l, 253 K

Ansatz

bestimme $P(j \mapsto i)$ für alle Übergänge $j \mapsto i$
versuche den Verlauf zu reproduzieren

Modell

Übergangsmatrix $A = (a_{ij})$ mit $a_{ij} = P(j \mapsto i)$

$$\chi(t) = \chi(0)^T A^{t/\Delta t} \chi(0)$$

Beobachtung

diese Approximation ist ungenügend
 $P(j \mapsto i)$ hängt von der Clusterverteilung ab

empirische Keimbildungsraten

Anzahl mittelgroßer Cluster

96³ CO₂-Moleküle, 3.05 mol/l, 253 K

Problem

kritische Clustergröße ist nicht zu ermitteln
wirklich große Cluster entstehen zu selten

Beobachtung

Yasuoka und Matsumoto (1998):

$\sum_{i>i^*} N_i(t)$ verläuft für verschiedene i^* parallel

Approximation

wähle ein i^* und bestimme daraus $J = \sum_{i>i^*} \dot{N}_i$
dieses J gilt auch für sehr große Cluster

Dauer der Clusterbildung

Vergleich von Keimbildungssimulationen

7¹⁶ CO₂-Moleküle bei 253 K und verschiedenen Dichten

Verlauf der Keimbildung

7¹⁶ CO₂-Moleküle bei 253 K und 3.05 mol/l

konkrete Zahlen

Probleme mit empirischen Keimbildungsraten

Ungenauigkeit: **mindestens** um den Faktor 10 je nach abgelesener Steigung

Wertebereich: nur geeignet für $J > 10^{31} \frac{1}{\text{m}^3 \text{s}}$

man erkennt nicht unmittelbar, ob J in diesem Bereich liegt

Extrapolation: gelten Beobachtungen für $\dot{N}_{50}$ wirklich auch für $\dot{N}_{(10^{20})}$?

ist der Keimbildungsmechanismus bei niedrigem J der gleiche?